

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS

SAINT - ANTOINE

15

THESE
pour le
DOCTORAT EN MEDECINE

(Diplôme d'Etat)

par

Mohamed Habib BEN GUIGA

NE LE 17 AVRIL 1941 A TUNIS

Présentée et soutenue publiquement le

1972

LA MALADIE DE DUBIN-JOHNSON

A PROPOS DES 4 PREMIERS CAS OBSERVES EN TUNISIE

PRESIDENT : MONSIEUR CAROLI, PROFESSEUR.

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS

SAINT - ANTOINE

THESE
pour le
DOCTORAT EN MEDECINE

(Diplôme d'Etat)

par

Mohamed Habib BEN GUIGA

NE LE 17 AVRIL 1941 A TUNIS

Présentée et soutenue publiquement le

1972

LA MALADIE DE DUBIN-JOHNSON

A PROPOS DES 4 PREMIERS CAS OBSERVES EN TUNISIE

PRESIDENT : MONSIEUR CAROLI, PROFESSEUR.



UNIVERSITE PARIS VI

FACULTE DE MEDECINE SAINT-ANTOINE

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2

Professeurs titulaires

— 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —

MM. ANDRE R.	Hématologie	MM. HUGELIN A.	Physiologie
BRISAUD H.	Pédiatrie	LAPLANE R.	Pédiatrie
BROCARD R.	Médecine	LE LORIER G.	Obstétrique
CAROLI J.	Médecine	LOEPER J.	Médecine expérimentale - Immunologie
CATINAT J.	Cardiologie	LOYGUE J.	Chirurgie
CERBONNET G.	Chirurgie	MARCOIS M.	Histologie
CHERIGIE Ed.	Radiologie	MERGER R.	Obstétrique
CHIGOT P.L.	Chirurgie infantile	MILHAUD G.	Biophysique
CONTAMIN Fr.	Neurologie	NICK J.	Neurologie
CONTE M.	Médecine	ORCEL L.	Anatomie pathologique
DAGUET L.	Bactériologie	PERRAULT M.	Médecine
DEBRAY J.	Médecine	POLONOVSKI Cl.	Pédiatrie
FLABEAU F.	Chirurgie	POLONOVSKI J.	Biochimie
GERBEAUX J.	Thérapeutique	RICHET G.	Néphrologie
GOSSET J.	Chirurgie	WOLFROMM R.	Médecine

Professeurs sans chaire

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

| | | | |
|----------------|--------------------|-----------------|---------------|
| MM. BRICOUT F. | Bactério-Virologie | MM. GOLVAN Y.J. | Parasitologie |
| CHALUT J. | Radiologie | LESTRADET H. | Pédiatrie |
| Mme CHAPUT A. | Stomatologie | PICARD J. | Biochimie |
| MM. DUHAMEL G. | Hématologie | ROUX Ch. | Embryologie |
| GIRARD F. | Physiologie | | |

Maîtres de Conférences

-:-:-:-:-


| | | | |
|------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| MM. AKOUN G. | Médecine | MM. LASFARGUES G. | Pédiatrie |
| ARDAILLOU R. | Physiologie | LAUGIER A. | Radiologie |
| BAUX S. | Chirurgie | LEVY V.G. | Médecine |
| BOURY G. | Chirurgie | MALAFOSSE M. | Chirurgie |
| CHEYMOL G. | Pharmacologie | MENSCH B. | Biophysique |
| CHOUARD Cl. | O. R. L. | MERY J. Ph. | Néphrologie |
| CLOAREC M. | Médecine | Mme MIGNON Fr. | Néphrologie |
| Mme COMBRISSE A. | Hématologie | MM. OPOLON J. | Médecine |
| MM. COSCAS G. | Ophtalmologie | PAQUELIN Fr. | O. R. L. |
| DAUTRY P. | Chirurgie | PIERON R. | Médecine |
| DELIGNE P. | Anesthésiologie | PISSARRO B. | Médecine préventive |
| DOYON D. | Radiologie | POULET J. | Médecine |
| DRY J. | Médecine | RAMPINI Cl. | Biochimie |
| FOUET P. | Thérapeutique | RICHARDET J.M. | Pédiatrie |
| GAUTIER H. | Physiologie | ROLAND J. | Anatomie pathologique |
| GRUNER M. | Chirurgie infantile | SALAT J. | Obstétrique |
| GUILMET Cl. | Anesthésiologie | SALMON Ch. | Hématologie |
| GUIRAUDON G. | Anatomie | SANTARELLI J. | Obstétrique |
| HERMAN D. | Médecine | WARGON H. | Médecine expérimentale |
| HUGUET Cl. | Chirurgie | WEINMANN S. | Biochimie |
| HUGUIER M. | Chirurgie | | |

Enseignants Associés

-:-:-:-:-

| | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| Professeur Associé | MM. BLOCH-MICHEL H. | Rhumatologie |
| M. C. A. Associé | ELIAKIS Em. | Médecine légale |

.../...



Enseignants Contractuels

-:-:-:-:-:-:-

M. C. A.

M. KIRSCH F.

Physiologie biochimique

Chargés d'Enseignement

-:-:-:-:-:-:-

MM. BENOIST

Rhumatologie

MM. DUNET

Endocrinologie

BRUEZIERE

Chirurgie infantile

LOFFREDO

Obstétrique

CRISTOL

Cardiologie

SALOMON

Rhumatologie

Attachés d'Enseignement

-:-:-:-:-:-:-

MM. CASASSUS

Cardiologie

MM. HIVET

Chirurgie

COUVREUR

Thérapeutique

MIGNOT

Neurologie

DES LAURIERS

Neurologie

SAUVAN


Cardiologie

GALLOUEDEC

Pneumologie

VANNIER

Pneumologie



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41547102_0015

A la mémoire de mon père

A ma mère

A ma femme

A mes enfants

A tous les miens

Pour tous leurs sacrifices
en témoignage de mon affection

A Monsieur le Professeur CAROLI

qui a bien voulu me faire l'honneur d'accepter de présider
cette thèse.

Qu'il veuille bien trouver ici le témoignage de ma gratitude
et de mon profond respect.

A mes maîtres

Le Professeur Agrégé J. POULET

Le Professeur F. CONTAMIN

qu'ils veuillent bien trouver ici le témoignage de mon
admiration et de mon respectueux attachement.

A Messieurs

le Professeur Agrégé S. MESTIRI

le Professeur Agrégé M. CHELLI

le Docteur N. HADDAD

En témoignage de ma profonde reconnaissance
pour tout ce qu'ils m'ont appris.

A tous mes amis les internes de l'Hôpital
Ernest Conseil et de l'hôpital Ch. Nicolle
de Tunis.

A mon maître le Docteur GAROUI

dans le service duquel ce travail a pu être réalisé.

Qu'il soit assuré de mon admiration et de mon atta-

chement sincère et durable.

7

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS

RECEIVED JAN 10 1964

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

A mon maître et ami, le Docteur M. GARGOURI

qui nous inspira ce travail, et qui a bien

voulu compléter notre formation médicale,

qu'il trouve ici toute mon admiration et

mes remerciements.

I N T R O D U C T I O N

En 1954, et à quelques mois d'intervalles, DUBIN et JOHNSON d'une part, SPRINZ et NELSON d'autre part, signalaient un syndrome qui porte désormais les noms des deux premiers et qui est constitué :

- d'un ictère chronique idiopathique familial apparemment isolé comportant certains critères particuliers :

- . ictère à bilirubine mixte,
- . existence d'un pigment anormal dans les cellules parenchymateuses donnant au foie une coloration noire,
- . aucune opacification biliaire possible par les moyens usuels tant en cholécystographie qu'en cholangiographie intra-veineuse.

Depuis, plusieurs précisions furent apportées sans pour autant résoudre complètement la physiopathologie de ce syndrome.

Nous rapportons dans ce travail les premiers cas observés en Tunisie à notre connaissance.

Nous commencerons par rappeler les caractéristiques de la maladie de DUBIN-JOHNSON.

Puis nous décrirons les cas que nous avons pu réunir.

Puis enfin, nous discutons les conclusions que nous avons pu tirer de ce modeste travail.

PREMIERE PARTIE

LA MALADIE DE DUBIN JOHNSON

A - RAPPEL PHYSIOLOGIQUE DU METABOLISME DE LA BILIRUBINE

1/ Origine de la bilirubine

La principale source de bilirubine libre (80 à 85 %) provient de la dégradation de l'héme des globules rouges circulants au niveau du système réticulo-endothélial (moelle osseuse, rate, foie).

Cette bilirubine est donc conditionnée par la durée de vie des hématies (120 jours en moyenne) 250 mg/jour de bilirubine sont produits pour une quantité d'hémoglobine libérée d'environ 6 g.

Les étapes de la transformation de l'Hb en bilirubine sont encore discutées.

Une plus faible proportion de bilirubine (10 à 20 %) provient :

- soit de la dégradation de certains globules rouges immatures dans la moelle osseuse (érythropoïèse ineffective)
- soit d'une destruction prématurée des érythrocytes après qu'ils aient quitté la moelle osseuse (réticulocytose inefficace)
- soit, elle peut être enfin, d'origine extra-hématopoïétique, il semble en effet, que l'organisme puisse fabriquer de la bilirubine sans passer par le stade de l'hémoglobine (elle serait en partie au moins d'origine hépatique) cette bilirubine est appelée bilirubine précoce.

La bilirubine libre est : liposoluble, insoluble dans l'eau, sa solubilité plasmatique est due à une liaison à la sérum albumine : chaque mole d'albumine peut fixer deux moles de bilirubine, la quantité de BNC fixée peut être ainsi de 600 à 800 mg/l. D'autres anions organiques peuvent entrer en compétition avec la bilirubine, sulfamides (gantrisine) salicylate, thyroxine et acides gras libres.

Chez les sujets ictériques, la liaison se fait avec l' α globuline.

La BNC est arrêtée par la membrane glomérulaire et n'est donc pas retrouvée dans les urines. Elle ne se retrouve pas dans la bile, elle peut par contre se fixer dans les lipides du tissu nerveux responsable alors du classique ictère nucléaire.

II/ Métabolisme intra-hépatique de la bilirubine :


Par voie sanguine, la bilirubine libre est véhiculée jusqu'au niveau de l'interface : sinusoīde/hépatocyte pour pénétrer dans cette cellule.

Ce passage peut se décomposer en trois phases :

1/ Pénétration dans l'hépatocyte : la bilirubine libre abandonne son support albuminique franchit la paroi du capillaire sinusoīdale, traverse l'espace de Disse et est alors captée par les micro-villosités, cette captation n'est qu'une application de la fonction d'épuration du foie. Notons que l'une des découvertes les plus intéressantes en ce domaine est la mise en évidence par Lévi, Catmaiton et Arias de deux protéines cytoplasmiques (protéines Y et Z) susceptibles de lier la bilirubine la BSP le vert d'indo-cyanine ; les opacifiants biliaires entrent en compétition avec les anions organiques et la bilirubine pour cette liaison.

La protéine Z est à son maximum dès la vie embryonnaire. La protéine Y croît avec l'âge ; ce fait pourrait peut-être rendre compte de l'icète physiologique des nouveaux-nés ictère majoré par la prématurité.

2/ Conjugaison de la bilirubine : la conjugaison se fait selon le schéma suivant :



La diglycuroconjugaison est assurée par les microsomes de la cellule hépatique en présence d'un enzyme : la glycuronyl transférase, le radical glycyronyl est fourni par l'acide uridine diphosphoglycuronique. Ce mode de conjugaison ne couvre pas la totalité de la bilirubine puisque 20 % se trouve sous d'autres formes en particulier sulfoconjuguées.

Les androgènes augmentent l'activité de la glycuronyl transférase chez la rate et les oestrogènes la diminuent chez le rat. Surtout un certain nombre de drogues dont on sait qu'elles stimulent la formation du réticulum endoplasmique lisse, augmentent la glycoroconjugaison : tels sont les 3,4 benzopyrène, la chloroquine, la pamaquine et surtout le phénobarbital...

Inversement, certaines drogues et composés inhibent la glycoroconjugaison de la bilirubine ; tels sont la novobiocine, la bunamiodyl (en partie) et certains stéroïdes dérivés du prégnane, présents en quantité dans le sérum de la femme enceinte. En fait, l'effet inhibiteur de ces stéroïdes est plus important lorsqu'ils sont eux-mêmes conjugués, et Hargreaves et Lathe se demandent s'ils doivent être assimilés aux substances dites choléphiles (comme BSP, le vert d'endocyanine, la novobiocine, etc..) qui empruntent les mêmes voies d'excrétion dans la bile.

Quoi qu'il en soit, ces modifications de la conjugaison ont une grande importance pratique car elles éclairent certains faits observés en clinique humaine et comportent une incidence thérapeutique.

3/ Excrétion : c'est par le pôle biliaire de l'hépatocyte que la bilirubine conjuguée est éliminée et seule la BC peut être éliminée par ce pôle. On connaît encore très mal les processus qui permettent l'élimination de la bilirubine conjuguée dans le canicule biliaire.

Ces trois stades successifs du métabolisme intra-hépatique de la bilirubine sont solidaires et ils se déroulent selon un ordre chronologique immuable. Qu'il y ait un trouble à l'un de ces trois stades, et les étapes ultérieures se trouvent du même coup supprimées.

On peut ainsi le concevoir, sur le plan théorique, plusieurs types de blocage intra-hépatique du métabolisme de la bilirubine :

- un blocage au niveau du pôle vasculaire de l'hépatocyte s'opposant à la pénétration de la bilirubine libre. La conséquence en est inévitablement l'accumulation de la bilirubine libre dans le plasma ;

L'absence de diglycuroconjugaison. Là encore, la cellule gorgée de bilirubine libre qu'elle ne peut éliminer cesse bientôt d'absorber celle qui se présente : il en résulte un ictère à bilirubine libre. Cette situation existe d'ailleurs chez certains rats de race Wistar : dans une lignée et à la suite d'une mutation, ces rats ont un déficit constitutionnel en glycoronyl-transférase. Ils présentent un ictère à bilirubine exclusivement libre : ce sont les classiques rats Gunn :

- Il peut s'agir d'une incapacité de l'hépatocyte à sécréter la bilirubine pourtant normalement conjuguée. Cette situation peut être reproduite en utilisant un corps qui est quelquefois responsable en clinique d'ictère médicamenteux puisqu'il appartient à la série des androgènes. La bilirubine est alors conjuguée en partie au moins mais, ne pouvant plus être éliminée, s'accumule dans la cellule puis reflue dans les vaisseaux provoquant un ictère qui est alors mixte, l'hypervilirubiminémie étant en partie libre et en partie conjuguée.

Nous verrons que dans la maladie de DUBIN-JOHNSON, ces trois types se trouvent représentés.

III/ Elimination de la bilirubine :

La bilirubine excrétée dans l'intestin se trouve transformée en stercobilinogène et en stercobiline qui est éliminé tandis que l'urobilinogène est l'urobiline réabsorbées par la circulation intestinale sont en partie rejetés par l'urine et en partie récupérés par le foie.

DEUXIEME PARTIE

=====

B - MALADIE DUBIN-JOHNSON

I/ Clinique :

La maladie de DUBIN-JOHNSON semble actuellement mieux connue (un peu plus de 200 cas mondiaux peuvent être recensés).

Observée dans les deux sexes avec une légère prédominance masculine.

Paraît géographiquement répandue la maladie a été observée dans toutes les races.

Elle survient le plus souvent avant 30 ans avec une moyenne autour de 14 ans ; mais elle se voit de la naissance à la vieillesse. PERREAU et coll. ont rapportés une observation avec apparition du 1er ictère à 71 ans.

Le diagnostic n'est souvent évoqué et confirmé qu'au bout de plusieurs mois voire années d'évolution (3 ans en moyenne dans 3 de nos observations). Il est retrouvé dans 1/3 des cas, la notion de pigmentation ictérique d'étiologie im précise dans la famille de ces malades.

1/ L'ictère : l'ictère chronique intermittent domine le tableau clinique sinon le résumé, il est exceptionnellement congénital. Le début peut être soit progressif soit rapide, il évolue avec des rémissions et des rechutes que peuvent déclencher les contraceptifs, les prises d'oestrogène, les interventions chirurgicales, les traumatismes graves et les stress, voire les maladies infectueuses et surtout la grossesse (on a classiquement constaté une action défavorable sur le déroulement de la gestation avec fréquemment des avortements, des enfants morts-nés ou anormaux ; pourtant dans notre expérience, nous n'avons observé aucune de ces complications).

En dehors de ces poussées, la pigmentation est souvent légère, les conjonctives ne sont même pas toujours colorées, le teint est seulement olivâtre, mais il est alors fréquent qu'il n'inquiète ni le médecin, ni l'entourage d'autant que d'autres personnes de la famille ont le même teint coloré ; ceci explique d'ailleurs que ces ictères de type constitutionnel ne soit découvert qu'à la 2e ou 3e décennie ou à l'occasion d'une poussée plus intense.

Cet ictère évoluant par poussées persiste d'une façon indéfinie mais malgré cette durée souvent supérieure à 20 ans, il est parfaitement toléré et ne s'accompagne d'aucun signe de souffrance hépatique même modérée : STEFANOVIC relate dans deux observations sur quatre des lésions de cirrhose ou de sclérose, mais il semble qu'il s'agisse, dans ces cas, d'une association essentiellement fortuites.

2/ Les signes fonctionnels :

L'ictère s'accompagne d'une façon inconstante d'asthénie plus ou moins marquée, de troubles digestifs sans spécificité : anorexie, dyspepsie, constipation modérée plus fréquemment que de diarrhée.

L'abdomen peut être douloureux d'une façon diffuse plus électivement à l'hypochondre droit, douleur sourde mais parfois quoique rarement, pouvant prendre l'allure de véritable colique hépatique.

Prurit céphalée et fièvre sont beaucoup moins fréquents.

3/ Les signes physiques :

L'examen physique de l'abdomen est pauvre. Soit abdomen souple, soit abdomen sensible essentiellement au niveau de l'hypochondre droit.

Le foie est souvent mais non toujours augmenté de volume, cette hépatomégalie est modérée, régulière, lisse sensible.

La splénomégalie est exceptionnelle. Dans la moitié des cas, les urines sont foncées, par contre, une fois sur dix seulement, les selles sont décolorées.

Malgré cet ictère chronique et contrairement aux ictères par hémolyse, il ne semble pas y avoir de lithiase pigmentaire. Les porteurs de DUBIN JOHNSON présentent la même incidence lithiasique vésiculaire que la population normale.

II/ BIOLOGIE

1/ Rétention biliaire : le syndrome de rétention biliaire est patent, mais cette hyper)bilirubinémie modérée est d'intensité variable entre 30 et 60 mg/l, elle peut atteindre des chiffres plus importants jusqu'à 200 mg/l.

Cette hyperbilirubinémie est faite pour une part importante de bilirubine directe, la bilirubine libre est soit normale, soit modérément augmentée ; telles sont du moins les constatations de notre propre expérience. Nous avons, par contre, relevé dans une revue de la littérature que la forme libre

pouvait varier de 10 à 75 % de la bilirubine totale ; mieux encore, chez le même malade, la bilirubine libre peut varier à des dosages successifs du simple au triple et plus du total.

La bilirubine totale augmente d'une façon importante mais transitoire (jusqu'à 500 mg/l) après tout acte chirurgical portant sur l'arbre biliaire.

L'étude chromatographique montre dans le sérum du pigment I (BL + BC) et du pigment II (B C) il n'y a pas de déficience en acide uridine diphosphoglyro-conjugué ni en transférase glycuronique.

Les phosphatases alcalines sont parfois légèrement supérieur à la normale.

2/ Les épreuves d'exploration hépato-cellulaires : sont toutes rigoureusement normales :

- cholestérol estérifié et total normaux
- lipides totaux et taux de prothrombine notamment sont dans les limites de la normale.

3/ Le syndrome de cytolyse : n'existe pas

Transaminases et O.C.T. ont des valeurs normales

4/ Le syndrome d'inflammation mésenchymateuse est absent.

5/ Examens hématologiques étant donné qu'il s'agit dans le DUBIN-JOHNSON d'un ictère à bilirubine mixte avec parfois une part importante de bilirubine libre, il faut éliminer en toute sécurité un syndrome hémolytique et l'on s'assure ainsi que anémie et fragilité globulaire anormale sont absentes.

L'électrophorèse de l'hémoglobine est normale. Il n'existe pas de signes de régénérations. Enfin, il n'y a pas d'agglutinines anormales dans le sérum et la durée de vie des hématies marquées au chrome radioactif est normale.

Mais à ce tableau, jusqu'ici peu spécifique, et qui par certains de ces caractères pourrait évoquer un ictère rétentionnel de type mécanique, trois constatations procurent une indiscutable individualité clinique, ce sont :

- les anomalies très particulières de l'élimination de la BSP
- l'impossibilité d'obtenir une opacification satisfaisante des voies biliaires en l'absence de lithiase.
- enfin, l'envahissement du foie par un pigment noir très caractéristique.

6/ Etude de l'épuration de la Bromo-Sulfo-Phtalénine (BSP)

Sans être pathognomonique, l'étude de l'épuration plasmatique de la BSP pratiquée selon la technique proposée par NYS et CAROLI (injection IV de 270 mg de BSP et dosage du colorant dans le sérum à la fois 10e, 30e, 75e ; et 120e minutes) est très évocatrice.

En effet, l'étude de cette épuration montre après une croissance assez rapide initiale du taux sanguin de la BSP (celle-ci passe par un minimum entre la 30e et la 45e minute) une allure ascendante de la courbe. La 2e pente P_2 a une valeur de sens contraire à celle de P_1 . Notons que dans les 45e premières minutes, la BSP peut être retenue d'une façon plus ou moins importante.

L'étude chromatographique montre que cette remontée correspond au passage dans le sang de fractions transformées de BSP qui est l'expression de la libération tissulaire du colorant préalablement fixé.

Cette BSP conjuguée remise en circulation est la traduction d'une phénomène de régurgitation par la cellule hépatique, comme la bilirubine, la BSP bien que conjuguée ne pouvant être éliminée qu'en quantité insuffisante dans le canicule biliaire reflué dans le lit veineux.

L'épuration complète s'effectue au bout de 4 heures environ.

Cette courbe d'épuration est constante d'un examen à l'autre.

L'épuration du vert d'indocyanine est pour beaucoup d'auteurs (CAROLI entre autres) normale.

III/ Examens radiologiques

La radio de l'hypochondre droit sans préparation élimine la lithiase opaque aux rayons X.

Mais surtout en dépit de tentatives répétées d'opacification des voies biliaires en dehors des poussées ictériques tant par voie orale que par voie intra-veineuse se sont soldés par des échecs, il n'y a aucune opacification des canaux biliaires en cholangiographie I.V. même à des contrôles tardifs (jusqu'à 12 heures) : on parle trop rapidement de vésicule exclue par les deux voies d'où la sanction thérapeutique logique qui en découle, la chirurgie pour ablation de la vésicule, qui évidemment se trouve indemne de toute lithiase. Cette non opacification est facile à comprendre puisque les opacifiants biliaires comme la bilirubine et la BSP doivent être conjugués avant d'être éliminés.

L'importance de cette non-opacification est variable dans quelques cas, certains auteurs (et notre propre expérience le confirme) ont pu obtenir une faible opacification des voies biliaires.

Par ailleurs, toutes les fois qu'une laparotomie a été faite chez des malades atteints de DUBIN-JOHNSON, l'opacification transvésiculaire montre un arbre biliaire tout à fait normal.

IV Anatomie Pathologie :

Les deux caractères essentiels de la maladie sont objectives facilement par la laparoscopie et la biopsie du foie .

1) LAPAROSCOPIE : Il est important comme le souligne Caroli d'insister sur le caractère fondamental de la laparoscopie pour le diagnostic de l'ictère de DUBIN JOHNSON; "tout ictère qui n'a pas fait la preuve exacte de son étiologie doit être soumis à laparoscopie " ; cet examen entre des mains entraînées est facile, ou ne le fera qu'après avoir contrôlé le taux de prothrombine .

L'aspect de la glande hépatique est souvent caractéristique: le volume du foie peut être légèrement augmenté de volume, sa morphologie , sa consistance ne sont pas modifiées, mais la couleur de la glande est franchement anormale : elle est très foncée , noir anthracite avec des reflets ardoisés, verdâtres ou bleutés, c'est le classique " black liver jaundice" . Cette coloration intéresse la totalité du foie. Il arrive exceptionnellement que la rate soit également noire comme dans l'une des observations de CAROLI.

Cet aspect ne s'observe jamais en dehors de la maladie de DUBIN JOHNSON il faut noter cependant que l'intensité de la coloration est inégale selon les malades et si dans la majorité des cas elle impose le diagnostic elle peut dans d'autres cas ne pas emporter la conviction.

La laparoscopie permet de vérifier l'intégrité de la vésicule et du péritoine .

2) BIOPSIE : le fragment hépatique retiré soit par biopsie chirurgicale soit par ponction biopsie à l'aiguille, est particulièrement évocateur, sa couleur noire est frappante et très suggestive .

a-) Histologie

- au microscope optique : l'architecture hépatique est pratiquement normale, l'hépatocyte est de morphologie normale, mais le cytoplasme de la plupart de ces cellules montre la lésion essentielle de la maladie DUBIN JOHNSON



la présence d'un pigment brun en amas ou en granulations situé dans les hépatocytes principalement dans les régions centro-lobulaires;. Ce pigment a été mis en évidence mais de façon beaucoup plus rare dans les cellules de Kupffer .

Il n'existe par ailleurs ni fibrose intra lobulaire ni altération de la trame recticulinique, un discret infiltrat inflammatoire des espaces portes n'est pas exceptionnel .

- au microscope électronique : On constate d'une façon fréquente mais non constante (OPPERMANN et COLL) que le reticulum lisse est beaucoup plus développé que normalement dans la plupart des hépatocytes, leur conférant un aspect très clair. Certaines vésicules lisses sont dilatées et contiennent un matériel floconneux .

Cette prolifération, bien que non spécifique prend un degré d'extension assez caractéristique. Les mitochondries sont nombreuses montrant une matrice dense, les crêtes endomitochondriales sont très mal visibles et il est parfois difficile de distinguer une mitochondrie d'un autre organe cellulaire de même taille. Certaines paraissent turgescentes et irrégulières. On ne peut éliminer un artefact expliquant ces anomalies . Des altérations fréquentes du pôle vasculaire des hépatocytes et de l'espace de Disse sont notées, les microvillosités des hépatocytes sont, en effet, souvent raréfiées la membrane basale difficile à distinguer par endroit devient presque linéaire.

L'espace de DISSE est parfois élargi et surtout contient les débris cellulaires à aspect poussiéreux et des organites cellulaires. Mitochondries, éléments du réticulum lisse ou granulaire- qui "flottent " librement dans l'espace .

On rencontre également dans l'espace de DISSE quelques fibres de réticuline et plus souvent de petites fibres de collagène groupées en amas et comme invaginées dans un recessus du pôle vasculaire de l'hépatocyte .

L'endothélium vasculaire, les cellules Kupffer, les capillicules biliaires sont normaux. Le pigment est centrolobulaire et localisé essentiellement au niveau des hépatocytes . L'étude de ce pigment anormal a été le centre d'intérêt de tous les auteurs .

Jusqu'en 1960, la plupart des auteurs s'accordaient pour penser que ce pigment est d'origine lipofus chinique. Nezeloff en 1959 écrivait : " ces propriétés trictoriels (du pigment) permettent de distinguer ce pigment des pigments biliaires mélaniques et caracténoïques et de le ranger dans le vaste groupe des chromo-lipoïdes et plus particulièrement dans celui des lipo-

fuschines, pigments constitués d'une matrice protéique et de chaînes plus ou moins polymérisées d'acides gras non saturés possédant à la fois des groupes acides et réducteurs libres " .

En 1960, CAROLI et COLL dans un cas privilégié de maladie de DUBIN JOHNSON où la rate aussi était noire procèdent à l'étude très poussée de ce pigment . Ils constatent tout d'abord l'existence de 2 types de pigments : le pigment I facilement visible , se présente sous la forme de graines de 1 à 2 μ de couleur brunâtre ; le pigment II très fin à la limite de la visibilité sans localisation spécifique très disséminé , ce pigment est brun noirâtre, il est très rare dans les cellules de Kupffer. Il ne s'agit ni d'un pigment biliaire ni de fer .

L'étude histochimique systématique a permis d'affirmer que :

" Le pigment anormal intra-hépatocytaire n'est pas de nature lipidique la soudonophilie positive du pigment I conduit à penser qu'un constituant lipidique ou lipioprotéique lui est probablement associé . La pigmentation anormale n'est pas lipofuscinique .

Elle n'est pas non plus glycogénique ou mucopolysaccharidique .

La pigmentation anormale contient-elle de la mélanine ? Ces grains de type II réagissent comme les mélanines en prenant le Bleu de méthylène, elles réagissent de même vis-à-vis du bleu de Nil " .

Cette hypothèse est enfin vérifiée en recherchant sur les coupes la présence de substrat initial; le plus important de la mélanogénèse à savoir la tyrosine par la réaction de Millon et l'action de la tyrosinase .

Par contre, la réaction à l'Indol d'EHRlich est négative bien que le noyau indol se trouve dans la molécule de mélanine .

En 1965, au colloque de l'Hôpital Saint Antoine Coppo et Coll précisent que :

- " 1) Le pigment indéterminé existe en amas polymorphes
- 2) Le cytoplasme des hépatocytes apparaît pauvre en ultra-structures différenciées .
- 3) Les mitochondries présentent quelques aspects de souffrance: en particulier, polymorphisme et mitochondries géantes .
- 4) Le réticulum endoplasmique paraît peu représenté dans sa forme granuleuse, tandis qu'il est très développé sous forme lisse avec des aspects d'hyperplasie véritable .
- 5) Les grains de pigment apparaissent diversement denses et affectent deux types différents , qui peuvent être présents


dans des structures séparées, ou bien coexister comme superposés dans la même structure .

- 6) Les petits grains de pigment semblent posséder une double membrane ; ils contiennent une zone astructurale beaucoup moins dense et semblent sans doute contenus à l'intérieur des lysosomes. On sait que les lysosomes sont des structures à activité enzymatique surtout hydrolitique. L'activité phosphatasique acide est typiquement celle des lysosomes .
- 7) L'étude au microscope électronique fait retenir comme improbable la nature lipofuchsinique du pigment indéterminé, qui semblerait plutôt de nature mélanique, mais avec les caractères d'une mélanine anormale. La densité du matériel pigmentaire n'est pas modifiée par les colorants électroniques
- 8) Un abondant matériel granuliforme diffus est disposé autour des vésicules du recticulum lisse .
- 9) Sur des coupes semi-fines contigües, un tel matériel granuleux diffus apparaît Schiff positif . D'après la coloration au plomb; il s'agit vraisemblablement de glycogène , mais structuré en agrégats divers et plus irréguliers par comparaison avec l'aspect du glycogène des biopsies hépatiques normales .
- 10) Les ductules biliaires observés après inclusion dans le méthacrylate présentent des aspects tout à fait normaux .

Au total, il y a surtout deux conclusions intéressantes :

- 1) le pigment présente deux types différents, comme s'il s'agissait de degrés divers d'élaboration et il est recueilli dans les lysosomes ;
- 2) le cytoplasme présente des signes de souffrances non spécifiques et d'altération structurale avec hyperplasie du réticulum lisse, mitochondries quelquefois géantes glycogène abondant, mais avec des aspects d'agrégation apparemment anormaux " .

En ce qui concerne la mélanie, on sait qu'elle peut avoir deux origines :



La mélanine obtenue par la voie I est un polymère du dopachrome, celle obtenue par la voie II est un polymère de l'adrénochrome .

La mélanine de DUBIN JOHNSON n'est pas d'origine tyrosinique, c'est en réalité un dérivé de l'adrénaline , alors que la mélanine du mélanosarcome dérive du dopa .

Enfin, plus près de nous en 1971, OPPERMAN et COLL (déjà cité) dans un cas de DUBIN JOHNSON chez un malade de 17 ans, retrouvent les 2 anomalies les plus évidentes et les plus caractéristiques touchant les hépatocytes : -l'accumulation de corps denses hétérogènes dans le cytoplasme et une prolifération du réticulum cytoplasmique sous sa forme lisse ou degranulée . Leur étude au microscope électronique de ce pigment les fait pencher pour sa nature lipofuschimique. Néanmoins, les travaux de Caroli (en faveur d'une origine mélanique anormale du pigment intra-hépatocytaire) ont reçu deux confirmations de poids .

1) Présence chez certains malades porteurs de DUBIN JOHNSON d'une mélanurie, mélanurie présentant les mêmes caractères biochimiques que la mélanine découverte dans le foie .

2) Surtout les travaux d' ARIAS sur le mouton Corriédale, ces moutons présentent une photo-sensibilité à l'exposition au soleil, due à un défaut d'excrétion de la phylloerythine porphirine dérivée de la chlorophylle. Ces moutons ont par ailleurs un foie noir comme dans le DUBIN JOHNSON avec hyperbilirubinémie directe , vésicule non opacifiée et rétention anormale de la B S P, les constatations histochimiques et spectrographiques du pigment se sont révélées comparables à celle de l'homme .

Les travaux d'ARIAS sur l'incorporation d'épinéphrine marquée permettent de constater, entre autre, que le pigment N'EST PAS LA CAUSE ,MAIS

LE TEMOIN DU TROUBLE d'EXCRETION dans la maladie .

Les moutons nouveau-nés possèdent le trouble d'excrétion de la bilirubine mais le pigment n'apparaît qu'au bout de 6 mois environ.

De même lorsqu'un patient atteint de DUBIN JOHNSON fait une hépatite et que son foie régénère, la pigmentation ne réapparaît qu'au bout de 5 à 6 mois . Autrement l'intensité de la surcharge pigmentaire reste immuable chez le même sujet à des années d'intervalle .

Au terme de ce survol force nous est de constater que la nature de ce pigment (qui est le témoin le plus fidèle dans la maladie de DUBIN JOHNSON) est encore controversée l'étude ultrastructurale ne permet pas de résoudre complètement les problèmes soulevés par l'histochemie .

En fait, beaucoup pensent qu'il faut sans doute dissocier dans la maladie de DUBIN JOHNSON, deux types possibles de pigments : mélanine et pigment voisin des lipofuschines (école lyonnaise) .

V- PHYSIOPATHOLOGIE :

Deux problèmes sont à considérer :

- le trouble de la sécrétion de la bilirubine conjuguée et la signification de la surcharge pigmentaire .

Le sens du défaut de sécrétion de la bilirubine conjuguée, trouble fondamental du syndrome de DUBIN JOHNSON, reste hypothétique. L'étude ultrastructurale n'est ici d'aucun secours, le microscope électronique ne révèle aucune altération des organites cellulaires susceptibles d'expliquer le trouble de la sécrétion biliaire, il a montré l'absence de dépôt biliaire intra-capillulaires .

Les signes de cholostase intra-hépatocytaires ne sont pas évidents.

Quant au transfert intra-hépatocytaires de la bilirubine libre ou conjuguée, même à des doses importantes, il n'entraîne aucune modification intra microscopique chez le rat normal ni chez le rat GUNN atteint de déficit en glucuronyl transférase (GAUTHIER) Par ailleurs, il est certain que ce transfert n'utilise pas les lysosomes. Reste les modifications du réticulum endoplasmique (OPPERMANN) leur réalité , une fois confirmée d'une façon formelle, pourrait aider à la clarification de la physiopathologie de DUBIN JOHNSON .

La signification du pigment si précieux pour le diagnostic de la maladie de DUBIN JOHNSON, semble plus facile à comprendre et nous l'avons

déjà dit, le pigment est un simple témoin contingent et peut être même non obligatoire des perturbations des voies métaboliques cellulaires secondaires au défaut d'excrétion de la bilirubine conjuguée . Les pigments représentant des lysosomes secondaires affectés d'un rôle de (nettoyage) cellulaire .

VI- HEREDITE .

La majorité des auteurs s'accordent actuellement pour estimer que la maladie DUBIN JOHNSON se transmet par gène autozomique dominant, mais les travaux de Butt à la Mayo Clinic, qui a étudié une famille comportant 258 membres, concluent qu'il existe de considérables variations dans l'expression de cette transmission, et, par conséquent, qu'il est extrêmement difficile actuellement de se faire une réelle opinion .

VII - DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :

Le diagnostic différentiel de la maladie de DUBIN JOHNSON fait passer en revue les diagnostics des ictères à bilirubine libre .

1) Les hyperbilirubinémies libres isolées .

Il s'agit d'ictères à urines de coloration normale et ne contenant pas de bilirubine .

A) Ictères par excès de production de bilirubine libre :

- a) hyperbilirubinémie tardive : l'ensemble des ictères hémolitiques ,
- b) l'hyperbilirubinémie précoce :

- ictère de la thalassémie,
- ictère de certaines porphyries
- ictère de la maladie de Biermer,
- certains ictères familiaux décrits par Israëls sous le nom de " Shunt hyperbilirubinemia " : il s'agit d'ictères chez des sujets dont certains ont présenté une anémie hémolytique guérie par une splénectomie; bien que la durée de vie des hématies soit alors normale, la bilirubinémie reste élevée .

B) Ictère par défaut d'élimination de la bilirubine libre :

- a) par diminution ou inhibition de la glucoronyl transférase hépatique . Il s'agit :

- de l'ictère physiologique du nouveau-né par immaturité hépatique

- de l'ictère du nyxoedème congénital par immaturité transitoire de la glycuro conjugaison.
- de l'ictère néonatal dû à une inhibition de la glucoronyl-transférase par un stéroïde contenu dans le lait maternel, c'est la " Breast milk jaundice " .
- de l'hyperbilirubinémie familiale transitoire avec mise en évidence dans le sérum maternel au deuxième trimestre de la grossesse , d'une substance inhibant la glycurocombinaison in vitro ,
- de certains ictères de la novobiocine qui peut inhiber l'enzyme de même que certains opacifiants biliaires ,
- de certains cas de maladie de Gilbert en rapport avec une carence génétique en glucuronyl transférase et à un degré supérieur,
- de l'ictère de Crigler-Najjar (nous y reviendrons)

b) Sans déficit en glucuronyl-transférase :

- certains ictères hépatiques dont l'hyper-bilirubinémie post-hépatique de Kalk,
- certains ictères accompagnant la sténose hypertrophique de pylore. Leur mécanisme est encore inexpliqué. S'agirait-il d'un désordre métabolique provoqué par les vomissements, d'un retentissement sur la glycuro-combinaison ou d'une compression portale ?

D'autres cas de maladie de Gilbert sur laquelle nous reviendrons.

2) L'hyperbilirubinémie mixte :

1) Nous éliminerons de ce groupe les hyperbilirubinémies mixtes où la bilirubine mixte représente moins de 30 % de la bilirubine totale; il s'agit des ictères par rétention qu'elle soit de nature hépatique ou mécanique et d'un quart des ictères des cirrhoses, de même que les ictères hémolytiques avec une bile épaisse dans le cholédoque et régurgitations surajoutées de bilirubine conjuguée .

2) Les hyperbilirubinémies libres supérieures à 30 % :

- les 3/4 des ictères des cirrhoses,
- l'ictère familial de Stranski qui se caractérise par une absence de bilirubinurie malgré une élévation de la bilirubine conjuguée plasmatique. Il faut pour l'expliquer admettre une double défaillance rénale et hépatique de l'excrétion du pigment conjugué .
- la cholostase intra-hépatique récidivante bénigne individualisée en 1959 par Summershill et Walshe .

Darnis et ses collaborateurs en ont fait en 1966 une revue détaillée : il s'agit d'une affection bénigne se traduisant par un ictère à rechutes de type rétentionnel avec selles décolorées et troubles de "petites insuffisances hépatiques".

Sur le plan biologique, au cours des poussées, il y a une élévation des deux bilirubines et des signes discrets d'insuffisance hépato-cellulaire.

Enfin sur le plan histologique, on a décrit des signes de cholostase intra-hépatique non spécifique.

Aucune étiologie n'a été retrouvée. Son début dans l'enfance ou l'adolescence ainsi que la découverte de formes familiales font suspecter une origine génétique.

Nous reviendrons pour terminer sur la maladie de Gilbert et le Syndrome de Crigler-Najjar.

Ce syndrome décrit en 1901 par Gilbert et Lereboullet, se manifeste sur le plan clinique par un seul et unique signe, qui est un ictère extrêmement discret, d'évolution chronique, avec d'éventuelles recrudescences paroxystiques.

Il s'y associe, sans que l'on puisse l'expliquer, des signes dits de la "petite insuffisance hépatique" : céphalées, intolérance aux graisses, sensibilité de l'hypocondre droit, asthénie.

Les urines et les selles sont toujours normales.

L'évolution est bénigne.

Sur le plan biologique, la bilirubinémie qui ne contient que la forme libre, atteint des taux plus ou moins élevés. Toutes les autres épreuves sont rigoureusement normales.

Les recherches actuelles permettent de mettre en évidence dans certains cas une réduction de la capacité de glycurombinaison du salicylate et des dérivés de la cortisone. En fait, la preuve directe de déficit en glucuronyl transférase ne peut être fournie que par la mesure de l'activité enzymatique du broyat de foie.

Radiologiquement, l'opacification des voies biliaires se fait normalement aussi bien par os que par voie intraveineuse.

Enfin sur le plan histologique en microscopie optique, l'histologie hépatique est strictement normale.

En microscopie électronique, les auteurs ont recherché s'il existait une anomalie du pôle vasculaire de l'hépatocyte qui puisse avoir une signification pathogénique de la maladie de Gilbert à contenu enzymatique normal. Palmatte et Simon ont ainsi décrit des altérations des hépatocytes au niveau de leur pôle vasculaire avec irrégularité des microvillosités, interruption des membranes, comblement

des espaces de Disse par du matériel cytoplasmique. Néanmoins, Peronnat a retrouvé les mêmes lésions, moins accusées, dans un cas de maladie de Gilbert à insuffisance enzymatique.

Cette cholémie familiale a une origine génétique et se transmet suivant un mode mendélien dominant.

En raison des similitudes existant entre la maladie de Gilbert et le syndrome de Crigler-Najjar, qui ne s'observe que chez les nourrissons, similitudes pathogéniques puisque le syndrome est interprété comme étant dû à un déficit majeur en glucuronyl-transférase, certains auteurs ont rapproché ces deux maladies formant de la maladie de Gilbert l'expression hétérozygote bénigne et tardive et du syndrome de Crigler-Najjar la forme homozygote grave et précoce.

Il semble exister à la maladie de DUBIN-JOHNSON une forme clinique très particulière : le syndrome de Rotor, Manahan et Florentin.

Cette affection est cliniquement voisine de celle du DUBIN-JOHNSON avec cependant une bilirubinémie souvent plus élevée. Classiquement, elle s'en distingue essentiellement par l'absence de pigment au niveau des hépatocytes.

En outre, si, dans la maladie de DUBIN-JOHNSON, le caractère familial est inconstant il est permanent dans le syndrome de Rotor.

Les études électroniques ont récemment permis de démontrer que Rotor et Dubin-Johnson pouvaient être considérés comme des degrés différents d'un même syndrome :

- déjà en microscopie optique, Arias a rencontré dans une même famille des sujets ictériques avec pigment et d'autres sans pigment ;

- Deussendre a décrit pour sa part des granules visibles au microscope électronique et invisibles au microscope optique : ces granules sont extrêmement proches de la maladie de DUBIN-JOHNSON.

- ainsi certains aspects de type Rotor au microscope optique seraient peut être de type DUBIN-JOHNSON au microscope électronique : il faudrait pour pouvoir l'affirmer, être certain de l'analogie des granules rencontrés . Il n'est pas possible pour le moment de dire si ces différences sont purement quantitatives ou qualitatives.

VIII/ TRAITEMENT

Une fois le diagnostic de maladie de DUBIN-JOHNSON affirmé, la seule attitude thérapeutique correcte est l'abstention.

On doit pleinement rassurer le malade quant à l'origine de ses troubles et surtout contre indiquer toute intervention chirurgicale inutile sur l'arbre biliaire.

c'est en effet le bénéfice le plus grand que doit retirer le malade, l'économie d'un acte opératoire sans raison.

Il n'est pas malheureusement rare de voir des malades porteur d'un DUBIN JOHNSON opérés et parfois même d'une façon itérative.

Il est évident que ces malades se comportent comme la population normale vis-à-vis de la pathologie tant médicale que chirurgicale.

Nous avons déjà évoqué l'association DUBIN-JOHNSON et lithiase vésiculaire son incidence est grossièrement la même (10 % environ) que dans la population normale.

Nous insisterons plus loin sur d'autres associations qui comportent des enseignements intéressants.

CAS N° 1

Madame REBH H... 26 ans, est hospitalisée pour la première fois dans le service en Mars 1969 pour ictère.

Mère de trois enfants sans aucun antécédant chirurgical, cette malade a présenté sur le plan médical :

- en 1961 : une fausse couche spontanée sans ictère
- en 1963 au 4^e mois de la deuxième grossesse (menée à terme) apparition d'un ictère jusqu'à l'accouchement.
- en 1965 nouvel épisode ictérique, en dehors de toute grossesse, de durée indéterminée (traité en ambulatoire).
- en 1966 toujours au 4^e mois de la grossesse (menée à terme) nouvelle poussée ictérique qui durera pendant toute la gestation.
- de nouveau en mars 1969 nouvelle poussée ictérique au 4^e mois de la 4^e grossesse :

C'est alors que la malade se fait hospitalisée car l'ictère s'accompagne à ce moment d'une asthénie importante.

A son admission, la malade présente, en même temps que l'asthénie et l'ictère franc cutanéomuqueux :

- une température variant entre 36°5 - 38°
- un hypochondre droit très sensible à la palpation.
- des urines foncées, des selles de coloration normale

L'abdomen en dehors de l'hypochondre droit est souple, la rate n'est pas perçue ; il n'y a pas de prurit.

La tension artérielle est à 11/6

Le reste de l'examen est par ailleurs normal on note cependant un souffle systolique manifestement anorganique.

La malade nous signale que sa soeur aînée présente la même symptomatologie ictérique.

Sur le plan biologique :

- groupe sanguin O Rh - B W - Urée 0,20 g par litre, glycémie 0,88 g/l
- VS 1^{re} heure 96 m/m
- 2^e heure 125m/m

La numération formule sanguine :

- hématies 2 700 000 m/m³
- polynucléaires 5 100 m/m³

- . neutro 69 %
- . éosino 3 %
- . baso 1 %
- lymphocytes 16 %
- monocytes 11 %
- plaquettes 370 000 m/m3.

La bilirubine totale est à 76 mg/l.

Phosphotases alcalines 2,62 U.B.

Cholestérol 2,30 g/l dont 1,40 g/l de cholestérol estérifié

Taux de prothrombine 68 %

Protides totaux 65,40 g/l avec électrophorèse sur papier normale

- . albumine 56,5 %
- . alpha 1 3,5 %
- . alpha 2 9 %
- . beta 11 %
- . gamma 20 %

Chez cette malade qui est très anémiée l'hématocrite est à 30 % et l'HB à 7,9 g/l.

Dans les urines : albumine et sucre sont absents.

Devant ce tableau associant un ictère à rechute et une anémie sévère, on pense à un syndrome hémolytique ; mais la morphologie et la résistance des globules rouges sont normales, il en est de même de l'électrophorèse de l'hémoglobine ce qui nous fait évidemment rejeter les diagnostics d'hémolyse.

On pense alors à un ictère (d'origine hépatique) les transaminases sont :

- . S G O T 200 U/cc
- . S G F T 290 U/cc

Réaction de Mac LAGAN : 5 U Vernes

HANGER 0

Réaction de gros 1,80 ml

On laisse sortir la malade au bout d'un mois d'hospitalisation avec toujours une bilirubine totale à 60 mg/l dont 45 mg de bilirubine directe et 15 mg indirecte La malade est revue deux ans plus tard en consultation externe du service pour une nouvelle poussée ictérique.

Bilirubine totale 37 mg/l

D 27

Ind 10 mg/l

Pendant 2 mois, cette malade sera mise à des traitements aussi variés qu'inefficace, on décide alors de réhospitaliser la malade pour une laparoscopie qui permettra de faire le diagnostic.

A son entrée, la malade présente un ictère modéré essentiellement muqueux ; l'abdomen est souple la rate n'est pas perçue le foie déborde de deux travers de doigt, il est à peine sensible, le reste de l'examen est normal en dehors d'une constipation modérée.

Le bilan biologique est strictement normal : entre autre la numération formule sanguine :

- G. B. 8 000 mm³
- G. R. 3 900 000 mm³

POLYNUCLEAIRES :

- neutro 64 %
- éosino 1 %
- baso 0 %

LYMPHOCYTES 32 %

MONOCYTES 3 %

Les tests hépatiques sont normaux, par contre la bilirubine totale :

- totale 26 mg/l
- directe 14 mg/l
- indirecte 12 mg/l

La laparoscopie faite par le docteur GARGOURI montre que :

- "le foie est légèrement augmenté de volume, son bord est mousse, sa surface est lisse, sa couleur noire verdâtre de cholostase
- la vésicule est normale blanc-bleuté
- le ligament rond est normal
- le péritoine est normal
- la rate n'a pas été vue".

En conclusion : foie le cholostase sans être très hypertrophique, vésicule normale, il s'agit soit d'une hépatite cholostasique, soit d'un ictère à pigment noir comme la maladie de DUBIN-JOHNSON.

Une ponction biopsique du foie a été faite à l'aiguille de MENGhini".

La biopsie du foie a été examinée par le docteur KAMMOUN :

"les fragments hépatiques examinés montrent une surcharge diffuse des hépatocytes par les granulations fines de pigment brunâtre. Les espaces portes présentent de plus une fibrose discrète infiltrée d'éléments inflammatoires. Ces granulations ne prennent pas les colorants du fer.

On ne note pas de thrombi-biliaire.

Ces images histologiques cadrent bien avec le diagnostic de maladie de DUBIN JOHNSON.

Absence de signe histologique de la malignité.

Une épreuve d'épuration de la B S P a été faite selon la méthode pronée par CAROLI, le résultat est très suggestif :

| | |
|------|------|
| 15' | 20 % |
| 45' | 15 % |
| 90' | 35 % |
| 135' | 40 % |
| 140' | 43 % |
| 180' | 50 % |

Depuis cette malade est régulièrement suivie dans le service. Nous avons profité d'un déjaunissement pour faire une cholécystégraphie orale qui montre une vésicule exclue. Il en est de même pour la cholographie intraveineuse. La mélanine n'a pas été retrouvée dans les urines.

CAS N° 2

Madame MERIEM H... soeur de notre première malade est hospitalisée en mars 1969 pour ictère à l'âge de 34 ans.

Mère de trois enfants, cette malade, sans aucun antécédant chirurgical a par contre une histoire médicale assez dense - elle a présenté en effet :

- un rhumatisme articulaire aigu vers l'âge de 11 ans mal traité
- un rétrécissement mitral découvert en 1967 ayant nécessité une hospitalisation de plus d'un mois

Quant à l'ictère, trois poussées sont à signaler avant l'épisode actuel :

- une à dix ans
- une à quatorze ans lors de la 1^{re} grossesse (nous ne pouvons obtenir aucune précision)
- une à 18 ans
- l'épisode actuel a nécessité l'hospitalisation.

A son entrée dans le service, la malade enceinte au 5^e mois, nous rapporte que depuis un mois elle présente : asthénie - céphalée - prurit - dyspepsie, tous ces signes évoluant par crise précédée de frissons, elle constate alors que ses urines sont foncées et ses conjonctives jaunes. A l'examen de cette malade au teint métisse, on note un faciès mongoloïde et un psychisme peu développé - l'état général semble bon.

Au niveau du thorax on note à droite un sein surnuméraire assez développé au dessous du sein normal.

Le rétrécissement mitral est retrouvé tant à l'auscultation (éclat de B1 et roulement diastolique) qu'à la radiographie du thorax (hyper vascularisation pulmonaire et léger débord droit).

L'abdomen est souple sur un hypochondre droit très sensible à la limite de la défense, le foie est de volume normal, mais la rate est palpable.

Il n'existe ni ascite ni oedème ni circulation collatérale.

Enfin la malade se plaint d'une dyspnée récente - sur le plan biologique :
groupe sanguin O-

urée 0,18 g/l

glycémie 0,80 g/l

BW -

N.F.S. G.R. 3 650 000 m/m3

G.B. 6 200 m/m3

Neutro 63 %
Eosino 1 %
Baso 1 %
Lymphocyte 31 %
Monocyte 4 %
Plaquettes 170 000 m/m3
Reticulocytes 8,7 % (II,III,IV d'après Heilmeyer)
V.S. 9/15

Bilirubine à 32 mg/l gros = 1,7 mg
 directe 26 mg/l Henger = négatif
 indirecte 6 mg/l Mac Lagan 16,60 Unités
T.P = 66 % soit 2,074 Mac Lagan

Phosphotèses 4,75 4B
Protides 79,70 g/l S G O T : 55
Cholestérol 2,10 g/l S E P T : 48

Devant ce tableau associant ictère, reticulocytose et rate palpable on évoque un syndrome hémolytique.

La résistance globulaire est à :

- . 5,8 % pour l'hémolyse initiale 6e tube
- . 3,24 % pour l'hémolyse totale 12e tube

La morphologie des globules :

- . mycrocytose légère
- . microsphérocytose

Enfin l'étude de l'hémoglobine :

- test d'Emel négatif
- recherche de l'HB résistante à la dénaturation alcaline 1,73 %
- électrophorèse de 1 hb sur papier

A + A (A₂ augmentée)

Le diagnostic de thalassemie minime est posé une bilirubine de contrôle est de 37 mg/l, la malade sort du service toujours ictérique.

Cette malade sera suivie d'une façon très régulière pendant deux ans. 3 nouvelles poussées ictériques sont constatées avec toujours une symptomatologique fonctionnelle très riche.

Lorsque le diagnostic de DUBIN-JOHNSON est évoqué chez sa soeur, nous hospitalisons la malade.

Le bilan hématologique montre de nouveau la tare thalassémique. La bili-

rubine totale : 25 mg/l

directe : 12 mg/l

indirecte : 13 mg/l

La laparoscopie pratiquée (TP à 86 %) montre une vésicule biliaire normale, le foie est de volume de consistance et de morphologie normaux, mais sa couleur est noire anthracite avec lacis de capsulite. Cet aspect est le même sur les deux lobes.

La rate est augmentée modérément de volume mais d'aspect normal.

Une ponction biopsie à l'aiguille est faite.

Le parenchyme hépatique est massivement envahi de grains de pigments irréguliers = la couleur est variable tantôt noirâtre, tantôt jaunâtre.

Le pigment est exclusivement réparti dans des hépatocytes normaux et électivement dans les zones centro-lobulaire. Cet aspect cadre bien avec ce diagnostic de DUBIN-JOHNSON.

Absence de signes de malignité.

La B S P pratiquée est parlante :

| | |
|------|------|
| 8' | 51 % |
| 15' | 22 % |
| 45' | 11 % |
| 75' | 15 % |
| 105' | 17 % |
| 135' | 23 % |
| 165' | 29 % |
| 185' | 40 % |

La recherche de mélamine dans les urines est négative.

Notons que nous n'avons pas réussi à opacifier la vésicule tant par voie orale qu'intraveineuse.

CAS N° 3

Monsieur BRAHIM H... 17 ans, frère de nos deux premières malades est hospitalisé pour examen systématique comme tous les autres membres de la famille que nous avons pu contacter.

Aucun antécédant chez ce jeune homme en pleine santé apparente, tout au plus constate-t-il depuis deux ans des urines plus colorées que normalement de temps en temps.

L'examen clinique est négatif, entre autre pas d'ictère.

La biologie est normale sauf :

- bilirubine totale à 21 mg/l

directe à 18 mg/l

indirecte à 3 mg/l

La laparoscopie montre un foie noir, nous nous abstenons de faire une ponction biopsie du foie à la demande express du malade.

La B S P là aussi ne laisse aucun doute quant au diagnostic :

| | |
|------|------|
| 8' | 40 % |
| 15' | 20 % |
| 45' | 7 % |
| 80' | 15 % |
| 120' | 22 % |

La recherche de MELANINE dans les urines par la méthode de Stewar Dunlop au chlorure de Fer est positive à deux contrôles successifs.

La vésicule est exclue par voie orale.

La cholangiographie I-V, par contre, imprégne correctement la vésicule et le choledoque qui sont normaux.

CAS N° 4

Monsieur Khelifa T... 26 ans, ouvrier est adressé dans le service par un confrère (médecin de travail) pour ictère chronique.

Il y a trois ans s'est installé chez ce malade, sans antécédant pathologique notable, un ictère cutanéomuqueux, sans aucune phase prodromique. Cet ictère s'accompagne d'urines foncées, mais les selles ne sont pas décolorées. Il n'y a aucun signe d'accompagnement.

Cet ictère a déjà motivé trois hospitalisations.

Nous n'avons aucune trace de la première.

La 2e fois, on notait sur le plan biologique :

- transaminases normales (10 - 13 U).
- un TP à 70 % des phosphates normales, un cholestérol une fois à 3 g/l les autres fois à 2,35 g/l et 2,20 g/l.
- les tests hépatiques sont normaux

La 3e fois, les mêmes résultats biologiques sont obtenus - la bilirubine est à 34 mg/l, la BSP retenue à 41 % à 15' et 28 % à 45', on conclut à l'époque à une hépatique prolongée d'allure bénigne.

Le médecin du travail envisage alors la possibilité d'une hépatique toxique (le malade travaillant depuis 6 ans dans la robinetterie : poussière de laiton = Cu - Zn - Pb) et nous l'adresse alors.

En fait outre qu'aucun produit incrimé n'ait d'épatotoxicité on devrait avoir dans le cadre d'une hépatique toxique une augmentation des transaminases.

Par ailleurs aucun signe en faveur d'un syndrome hémolytique n'est retrouvé.

Le malade nous apprend que sa mère avait eu 2 épisodes d'ictères interrompu de deux grossesses.

Nous éliminons successivement dans le service les diagnostics :

- d'hépatite prolongée
- d'hépatite toxique et enfin d'un syndrome hémolytique

et nous évoquons le syndrome de DUBIN-JOHNSON.

La biologie : Groupe 1 -

Urée 0,18 g/l

Glycémie 1,96 g/l

Protides totaux 70 g/l

N.F.S. : G R 4.600 000 m/m³
G B 8-100 m/m³

Neutro 71 %
Eosino 1 %
Baso 0 %
Monocytes 3 %
Lymphocytes 25 %

V.S. 20/51

Bilirubine totale = 41 mg/l
directe = 30 mg/l
indirecte = 11 mg/l

La laparoscopie montre le classique foie noir

La B S P pratiquée donne les résultats suivants :

| | |
|------|-------|
| 8' | 100 % |
| 15' | 60 % |
| 45' | 25 % |
| 75' | 50 % |
| 135' | 42 % |

La ponction biopsie du foie révèle :

" Les fragments hépatiques examinés montrent une surcharge diffuse des hépatocytes par des granulations fines de pigment brunâtre. Les granulations, de taille variable, sont régulièrement répartis. Le parenchyme, par ailleurs, ne montre aucune autre lésion. Ces aspects histologiques cadrent bien avec le diagnostic, le syndrome de DUBIN JOHNSON.

Absence de signe histologique de malignité.




Tableau représentant la famille de nos 3 premiers cas de Dubin-Johnson

Sexe Masculin

ou

Personnes décédées

ou **Personnes examinées**

ou ⊕ Dubin-Johnson certain

Suspicion de Dubin-Johnson

Autre tare congénitale

Sexe féminin

V- ENQUETE FAMILIALE

1°) Pour ce qui concerne notre dernier malade, nous n'avons malheureusement pas pu faire d'enquête familiale pour des raisons purement matérielles.

La seule précision que nous avons est que la propre mère de notre malade a présenté deux épisodes ictériques francs au cours de deux grossesses (sur 8 grossesses au total) .

2°) En ce qui concerne la première famille, une fois le diagnostic confirmé chez nos deux premières patientes, nous avons tenté une enquête familiale, et c'est d'ailleurs ainsi que nous avons dépisté notre 3 ème cas .

La famille H ... se compose en plus du père et de la mère, de six enfants en vie et six enfants décédés .

Enfin, il y a sept petits enfants. Au total 15 personnes en vie
Les six décédés chronologiquement :

- 2 garçons à 18 mois probablement d'un syndrome infectieux
- 1 garçon à 2 ans d'un ictère
- 1 garçon à un an de cause X
- 1 garçon mort-né
- 1 fille à 17 ans d'une maladie infectieuse aiguë

Tous ces renseignements sont donnés par la mère d'une façon très approximative, le père n'étant d'aucun secours .

Nous avons examiné successivement :

La mère: Mabrouka H 58 ans

- examen clinique normal
- laparoscopie : foie de couleur normale
- vésicule parfaitement opacifiée par voie orale
- bilirubinémie 9 mg/I .Totale avec 0 de bilirubine directe .

Le père : Alf H... 67 ans , que nous soupçonnions d'être le porteur de la tare avait dans ses antécédents semble t'il deux épisodes ictériques avec urines foncées, mais sans troubles importants .

- examen clinique normal
- laparoscopie foie vésicule et rate normaux comme coloration et comme volume .
- bilirubine totale 4 mg/l, taux 0 la directe
voies biliaires opacifiées par voie orale .

| | | |
|---------|------|------------------|
| B S P : | 8' | 50 % |
| | 15' | 12 % |
| | 45' | 2 % |
| | 75' | 2 % |
| | 90' | |
| | 120' | aucune rétention |
| | 180' | |

Nos"espoirs furent donc déçus "

Un frère : Brahim H 22 ans

- Laparoscopie normale

Une fille : Fatma H ...

- débile mentale profonde, n'a pu être examinée. Nous avons pu enfin examiner deux des trois enfants de notre première malade .

Ezzeddine T ... 5 ans

- Cliniquement R A S

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| - Bilirubine | totale | = 14 mg/l |
| | directe | = 8 mg/l |
| | indirecte | = 5 mg/l |

Youssef T ... 18 mois

Cliniquement R A S

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| Bilirubine | totale | = 16 mg/l |
| | directe | = 10 mg/l |
| | indirecte | = 6 mg/l |

DISCUSSIONS .

Au terme de cette enquête, un certain nombre d'éléments peuvent être dégagés .

Sur 14 personnes en vie, 9 ont pu être examinées.

Sur ces 9 personnes, 3 sont porteuses d'un de DUBIN JOHNSON certain, 2 (les deux petits de notre première malade) peuvent être légitimement suspectés d'être eux aussi porteurs de DUBIN JOHNSON quoiqu'il en soit l'avenir tranchera et nous essayons pour notre part de les suivre .

1 personne est débile mentale profonde .

Le caractère autosomique dominant de la transmission de la tare admis par certains est en défaut dans notre enquête , puisque, en effet, ni la mère ni le père ne sont atteints au moins d'une façon patente, reste le cas de notre C A S n° 2 .

PATHOLOGIE ASSOCIEE

Madame Merieme H... présente, en effet, à côté d'un rétrécissement mitral d'origine rhumatismal, relativement bien toléré :

- 1) une thalassémie mineure
- 2) un syndrome de DUBIN JOHNSON
- 3) une débilité mentale légère
- 4) une malformation embryologique : sein surnuméraire

C'est évidemment l'association DUBIN JOHNSON thalassémie qui pose les problèmes les plus intéressants .

La symptomatologie clinique de notre malade semble être due aux 2 maladies puisqu'elles reconnaissent les mêmes causes déclenchantes (entre autre la grossesse).

Il est très difficile de faire la part de chaque syndrome dans cette symptomatologie, mais quoiqu'il en soit, c'est chez cette malade que les signes fonctionnels sont les plus bruyants et il est légitime de penser que cet état est dû à l'association des 2 tares, sinon de l'aggravation de l'une sur l'autre pendant les poussées .

Cette association renforce encore l'idée de la nature congénitale de la maladie de DUBIN JOHNSON, sans bien sûr en donner la clef .

Une autre association relevée dans la littérature mérite d'être notée : celle de VAN CAUTHER et COLL :

Il s'agit d'une femme de 45 ans qui associait DUBIN JOHNSON et lupus erythémateux diffus :

VAN CAUTHER rappelle que :

" Le lupus est une affection où l'on invoque un trouble du métabolisme de la phénylalanine ; on a décrit une augmentation de l'excrétion urinaire de l'acide 2-5 dihydroxyphényl pyrurique. De plus, une amélioration clinique de la maladie peut être obtenue par la diététique, restriction des aliments riches en tyrosine et en phénylalanine " .

" Notre patiente associait donc deux dysmétabolismes. Nous nous sommes posés , sans pouvoir la résoudre, la question de savoir s'il y avait une relation entre les deux affections qu'elle présentait; le lupus dysmétabolisme tyrosinique et le DUBIN JOHNSON maladie où le foie est riche en tyrosine (alors que le foie des sujets normaux est presque dépourvu de cet acide aminé) mais où la mélanine n'est pas d'origine tyrosinique " .

Notre expérience confirme

a) la totalité inocuité de la maladie de DUBIN JOHNSON sur (évolution sur plus de 26 ans chez notre 2^{ème} malade)

b) Le déclenchement des poussées ictériques .

Entre autre par la grossesse, mais nous n'avons pas relevé pour notre part, de rôle néfaste de cet ictère sur le produit de conception (au total 5 naissances normales avec ictère durant la gestation, une seule fausse couche chez notre première malade sans ictère) .

Notons aussi la date d'apparition de l'ictère au cours de la grossesse toujours pratiquement au 4^{ème} mois

c) la possibilité de retrouver la mélanine dans les urines (un cas sur quatre)

d) enfin, la possibilité de visualiser la vésicule biliaire rarement (un cas sur trois) .

Il ne nous a pas été possible, malheureusement, de pousser plus loin nos investigations et ce pour des raisons très variées .

Essentiellement nos capacités d'investigations complémentaires (microscopie électronique, histochimie, etc...) sont limitées. Une raison et non des moindres, provient des malades eux-mêmes . En effet, une fois rassurés quant à leur syndrome, ils comprennent très mal qu'on puisse les garder à l'hôpital et leur faire subir des examens apparemment inutiles .

Telle est donc notre expérience bien modeste de ce syndrome passionnant .

C O N C L U S I O N .

5 La conclusion que nous pouvons tirer de notre expérience du syndrome de DUBIN JOHNSON se situe à deux niveaux .

A - LE NIVEAU PRATIQUE : la maladie de DUBIN JOHNSON est actuellement bien connue, elle entre dans le cadre des troubles du métabolisme de la bilirubine. C'est une maladie métabolique, héréditaire chronique dont l'ictère à bilirubine mixte (à prédominance directe ou conjuguée) résume le plus souvent le tableau clinique .

Trois caractères lui confèrent sa spécificité :

1- les anomalies particulières de l'élimination de la B S P avec une première peute P_1 sensiblement normale et surtout au delà de la 45^e minute on se voit se dessiner une peute P_2 ascendante traduisant la régurgitation dans le sérum de la B S P conjuguée .

2 - La couleur noire anthracite du foie à la laparoscopie et son envahissement à l'histologie par un pigment noir dans l'hépatocyte très caractéristique d'origine probablement mélanique .

3 - L'impossibilité d'obtenir une opacification des voies biliaires en l'absence de lithiase .

La maladie de DUBIN JOHNSON est une maladie de toute une vie; mais elle est d'une totale inocuité et actuellement aucun traitement n'est ni possible, ni nécessaire; le seul traitement logique reste donc l'abstention.

B - Le niveau théorique malgré le nombre de plus en plus important de cas rapportés, malgré les études de plus en plus poussées , la pathologie de ce syndrome reste du domaine des hypothèses .

a) l'étude du pigment hépatique, nous l'avons vu, ne peut résoudre le problème ; en effet, il n'est que le témoin et non la cause du trouble métabolique .

b) les études ultra structurales sont plus prometteuses. Les anomalies du pôle vasculaire, observées de mieux en mieux, diffuses et contrastant avec la conservation générale des autres structures semblent devoir être retenues . Les études histo chimiques, génétiques, voire immunologique apporteront la clef de ce syndrome, bien qu'actuellement on ne soit qu'au domaine des hypothèses .

B I B L I O G R A P H I E .

A part quelques auteurs, nous nous sommes volontairement limités dans cette bibliographie aux études d'expression française que nous avons pu directement consulter .

Nous tenons aussi à préciser que nous nous sommes très largement inspiré des travaux de CAROLI (8) et de l'article de M. HECHT (32) Le métabolisme de la bilirubine et ses troubles .

- 1- DUBIN IN., JOHNSON F.B., chronic idiopathic jaundice with unidentified pigment in liver cells : a new clinicopathologic entity with a report of 12 cases. *Médecine* 1954 - 24- 151.
- 2- SPRINZ H. NELSON R.S., Persistent non hemolytic hyperbilirubinemia associated with lipochrome like pigment in liver cells. Report of 4 cases
Med 1954, 41, 952
- 3- WARMOES F. DE DEURWARDERE J., VAN DEN EYENDE P. ,BODDAERT J. , un cas d'ictère de DUBIN JOHNSON, *Act. Gastro-entero. Belg.* 1957, 20, 525 .
- 4- NYS A. , CAROLI J. Etude critique du test de la B.S.P. *Sem. Hop. PARIS Path. et Bio.* 1956, 32, RM 441/P et B. 1001 /
- 5- STEFANOVIC S. NESKOVIC B., SAVIN S. , MILOS, WIJENA A. et Mme PROTIC D. L'ictère chronique avec pigment d'origine inconnue dans les hépatocytes. *Revue Int.d'hépat.* 1958 , VIII, 413
- 6- NEZELOF CH. Le syndrome de DUBIN JOHNSON
Journées Pédiatriques pp. 125, 131, 21- 22 M Mars 1959 .
- 7- ARIAS I.M. Instability of Metabolic basis of inherited hyperbilirubinemia .
Liseas, chap.37
- 8- WEGMAN R. , RANGIER M. , ETEVE J., CHARBONNIER A., CAROLI J.
Mélanohe hépatocellulaire avec ictère chimique à bilirubine directe
maladie de DUBIN JOHNSON ? Etude clinique et biologique de la maladie
Etude histochimique, chimique et spectrographique du pigment anormal.
Sem Hop.Paris 1960, 36, 1760
- 9- CATTAN C, ACAR J., RANGIER M., JOUBAUD A, HABIB R., Maladie de DUBIN JOHNSON avec mélanurie . *Sem.Hop.Paris* 1960, 36, 3019
- 10-CHARBONNIER A, BONNEVILLE B, BRISSON P. et CAROLI J.
Ictère mixte idiopathique à poussées successives.
Sem.hop.Paris 1960 - 36, 1781
- 11- ASKIRELI BUNSTETTER GELLIER . Maladie de DUBIN JOHNSON
Rev.Med.chim. des maladies du foie 1960 n°2, 123 .
- 12-BRETTE R. TOLOT F. TISSOT A, BRYON P., A propos de 2 cas de DUBIN JOHNSON
Arch. Mal. appar.dig. 1964, 53, 727 .

- 13- MOGENA H.G., VALLE JIMENEZ A., GONZALES CAMPOS C. OLIVAH
Un syndrome de DUBIN JOHNSON chez deux frères. Acta.Gastro.Ent. belg.
1964, 27, 719 .
- 14- LEMONNIER F. , JULIEN C, CHEVREL B. , CAROLI J.,
Intérêt diagnostique de l'épreuve couplée B.S.P vert d'indocyanine
e en pathologie hépatobiliaire. Path. Biologie 1963, 11, 1362 .
- 15- BUTT K, ANDERSON V.E., and coll. Studie of chronic idiopathie jaundice
(DUBIN JOHNSON syndrome) Evoluaton of large family withe the trait
Gastr.Ente. 1966, 55, 619 .
- 16- Coppo.M. et Coll : Syndrome de DUBIN JOHNSON
Revue Med.Chirurg. Mal foie 1965, 40, 127 .
- 17- PICHOT JANTON et Coll. Maladie de DUBIN JOHNSON. Relation d'une obser-
vation familiaiale . Arch. Fr. Pédiat. 110, n° 8, 1023 .
- 18 - Y.CUSSAC et Coll. Modification ultra structurales des hépatocytes
dans un cas d'ictère chronique idiopathique de type DUBIN-JOHNSON.
Ann. Anat.Path. Paris 11 - 37- 54 Janvier Mars 1966
- 19- B.HILLEMAND. Les ictères métaboliques par déficit enzymatique des
hépatocytes. Sem. Hop. 1965. 41, 1821 .
- 20- PERREAU P. et coll. 2 cas de Maladies de DUBIN JOHNSON
Société de gastro-ent. de l'OUEST séance du 25/6/1967 .
- 21- HECHT Y. - Le métabolisme de la bilirubine et ses troubles :
les ictères rares . Conc. Méd. 1965, 87, 52- 7775
- 22- BRETTE R. PASQUIER, J. TISSOT A. Les ictères métaboliques constitution-
nels . Jour.Med.Lyon 1965, 46, 511 .
- 23- PIARD D. , COMBET J., CABANNE F., MICHIELS R. et FERREC (Dijon)
Maladie de DUBIN JOHNSON (à propos d'I observation)
Rev.Med. Lyon Juin 1968, 491 .
- 24- AGNOLUCCI M.I. et coll. Biopsie démonstration of the onset of the
DUBIN JOHNSON syndrome Minerva Med. 1969, 60, 2205 .
- 25- PAGES A, et coll. Syndrome de DUBIN JOHNSON,-ANN. Anat.Path. 1969
I4, 77 .

- 26- PARIS J.C. - Maladie de DUBIN JOHNSON Lille Med.1969, , 14, 623.
- 27- LAGERON A, PARAF A., TRAD J, DESCHE S.
Les surcharges hépatiques primitives à " pigment brun" le
problème des lipofuschines .
Presse Med. 1968, 76, 251 .
- 28- Irwin MARIS . Bilirubine métabolisme Research Aspects Hospital
Pratice January 70, 27 .
- 29- N.B. JAVITT. Differentiation and management of the patient with
jaundice
Hopital Pratice january 70 34.
- 30- BEL A. , VAUZELLE J.L., CHAPUY H., LEUNG T.K., PATRICOT L M. GIRARD M.
La maladie de DUBIN JOHNSON.
A propos d'une observation inédite avec étude en microscopie électronique . Les inclusions hépatocytaires.
Jour. Méd. Lyon 1971, 52, 1743 .
- 31- VAN CAUTER J. DAUBRESSE J.CL., LIGNY G. ,MEUNIER R.
Un syndrome de DUBIN JOHNSON chez I patiente atteinte de lupus
érythémateux diffus. Act. Gastro. ent. belg. 1971, 34 . 700
- 32- HECHT Y. Le métabolisme de la bilirubine et ses troubles.
Rev. Med. Chim. Mal. foie 1971, 46, 53 .
- 33- PARAF A., TRAD J., LAGERON A, BENSOUSSAN D,
Les surcharges hépatiques à pigment brun, les lipofuschimies.
Monographie annuelle de la Société Franc. Le biol.Chimiq.1971
Les maladies à dépôt.
- 34- La maladie de DUBIN JOHNSON . Conc.Méd. 90, 8, 1644 , 1968
- 35- HADCHOUEL A, CHARBONNIER, LAGERON, LEMONNIER, RAUTEREAU, SCOTTO,CAROLI
A propos d'une nouvelle forme d'ictère , chronique idiopathique. REV.MED.
chirur. Mal.Foie 1971 , 46, 61
- 36- OPPERMANN A. et coll. Syndrome de DUBIN JOHNSON: données ultra struc-
turale. Sem.Hop.Paris 1971 47, 2721.

- 37- MASASUKE , MASUDA (Kyoto) A case o/DUBIN JOHNSON, syndrome complicated with serum hépatites . Rev. Int. Hept. 1965 XV 1227
- 38- MINIO F, MAGNENAT et A. GAUTHIER.
L'ultra structure du foie humain lors d'ictères non hémolytiques chroniques constitutionnels .
Rev. Int. Hépat. 1965 XVI , 323 .
- 39- BOUHAHAM; ictère par anomalie du métabolisme de la bilirubine
Tunisie Med. 1964, 429 .

Vu, le Président de Thèse

M. le Professeur CAROLI

Vu, le Doyen de la Faculté

SAINT-ANTOINE

M. le Professeur LOYGUE

Vu et Permis d'imprimer

Le Recteur de l'Académie de Paris

R. MALLET

